

**Sumár stromov a kríkov pasportu mestskej zelene
mesta Dunajská Streda**

STROMY		
Kry (ks)	2799	
Dĺžka línií (m)	8386,4	
Celkový počet hodnotených stromov (ks)	11904	
Typ stromov	Počet	%
Listnaté stromy	8528	71,6 %
Ihličnaté stromy	3376	28,4 %
Druhové zastúpenie stromov	Počet	%
Tilia cordata Mill.	905	7,6 %
Platycladus orientalis (L.) Franco	717	6,0 %
Betula pendula Roth	683	5,7 %
Acer platanoides L.	646	5,4 %
Picea abies (L.) H. Karst.	548	4,6 %
Acer pseudoplatanus L.	542	4,6 %
Robinia pseudoacacia L.	517	4,3 %
Pinus sylvestris L.	429	3,6 %
Thuja occidentalis L.	365	3,1 %
Fraxinus excelsior L.	317	2,7 %
Juglans regia L.	305	2,6 %
Prunus sp.	289	2,4 %
Pinus nigra J. F. Arnold	235	2,0 %
Tilia platyphyllos Scop.	193	1,6 %
Prunus cerasifera Ehrh.	163	1,4 %
Acer platanoides Globosum	149	1,3 %
Aesculus hippocastanum L.	147	1,2 %
Picea pungens Engelm.	145	1,2 %
Negundo aceroides Moench	123	1,0 %
Prunus serrulata Lindl.	114	1,0 %
Carpinus betulus Fastigiata	111	0,9 %
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.	107	0,9 %
Thuja plicata Don ex D.Don	103	0,9 %
Fraxinus ornus L.	98	0,8 %
Tilia x vulgaris Hayne	95	0,8 %
Prunus fruticosa 'Globosa'	94	0,8 %
Tilia sp.	94	0,8 %
Prunus cerasifera Atropurpurea	91	0,8 %
Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.	86	0,7 %
Taxus baccata L.	86	0,7 %
Prunus avium (L.) L.	85	0,7 %

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	82	0,7 %
Catalpa bignonioides Walter	76	0,6 %
Acer pseudoplatanus cv	75	0,6 %
Fraxinus excelsior cv	74	0,6 %
Prunus domestica L.	70	0,6 %
Juniperus sp.	66	0,6 %
Koelreuteria paniculata Laxm.	63	0,5 %
Picea pungens Glauca	60	0,5 %
Fraxinus ornus cv	59	0,5 %
Quercus robur L.	58	0,5 %
Fraxinus pennsylvanica Marshall	56	0,5 %
Prunus cerasifera Nigra	54	0,5 %
Populus nigra Italica	53	0,4 %
Prunus avium L.	52	0,4 %
Fraxinus ornus Mecsek	51	0,4 %
Prunus serrulata cv	48	0,4 %
Acer campestre L.	46	0,4 %
Thuja occidentalis Columna	46	0,4 %
Malus domestica Borkh.	44	0,4 %
Populus simonii Carrière	43	0,4 %
Populus x canadensis Moench	39	0,3 %
Populus alba L.	38	0,3 %
Catalpa bignonioides cv	37	0,3 %
Picea omorika (Pančič) Purk.	37	0,3 %
Populus nigra L.	36	0,3 %
Chamaecyparis sp.	36	0,3 %
Picea abies cv	35	0,3 %
Abies alba Mill.	35	0,3 %
Sophora japonica L.	34	0,3 %
Carpinus betulus 'Columnaris'	33	0,3 %
Acer platanooides cv	33	0,3 %
Celtis occidentalis L.	33	0,3 %
Ulmus glabra Huds.	32	0,3 %
Robinia pseudoacacia cv	32	0,3 %
Prunus cerasus L.	32	0,3 %
Populus x canescens (Aiton) Sm.	31	0,3 %
Fraxinus sp.	30	0,3 %
Gleditsia triacanthos L.	29	0,2 %
Liquidambar styraciflua L.	29	0,2 %
Ulmus minor Mill.	28	0,2 %

Ulmus sp.	28	0,2 %
Salix integra cv	28	0,2 %
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.	27	0,2 %
Salix sp.	27	0,2 %
Populus alba Pyramidalis	27	0,2 %
Elaeagnus angustifolia L.	26	0,2 %
Platanus occidentalis L.	26	0,2 %
Salix matsudana Tortuosa	25	0,2 %
Carpinus betulus cv	24	0,2 %
Ulmus pumila L.	24	0,2 %
Crataegus monogyna Jacq.	24	0,2 %
Catalpa bignonioides Nana	23	0,2 %
Photinia glabra (Thunb.) Maxim.	22	0,2 %
Cupressocyparis leylandii (Dal. Jacks.) Dall.	22	0,2 %
Crataegus laevigata (Poir.) DC.	22	0,2 %
Larix decidua Mill.	22	0,2 %
Quercus sp.	21	0,2 %
Morus alba L.	20	0,2 %
Prunus cerasifera cv	20	0,2 %
Juniperus communis L.	20	0,2 %
Prunus armeniaca L.	19	0,2 %
Rhus typhina L.	19	0,2 %
Prunus laurocerasus L.	18	0,2 %
Taxus cuspidata Siebold et Zucc.	17	0,1 %
Hibiscus syriacus L.	16	0,1 %
Non specific	16	0,1 %
Ficus carica L.	15	0,1 %
Juniperus chinensis L.	15	0,1 %
Syringa vulgaris L.	14	0,1 %
Salix fragilis L.	14	0,1 %
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.	14	0,1 %
Picea glauca (Moench) Voss	14	0,1 %
Fagus sylvatica L.	14	0,1 %
Morus sp.	14	0,1 %
Abies nordmanniana (Stev.) Spach	13	0,1 %
Thuja occidentalis cv	13	0,1 %
Photinia x fraseri cv.	13	0,1 %
Pinus sp.	12	0,1 %
Quercus cerris L.	12	0,1 %
Thuja sp.	12	0,1 %

Pinus sylvestris cv	12	0,1 %
Quercus petraea (Mattusch.) Liebl.	12	0,1 %
Chamaecyparis pisifera Boulevard	12	0,1 %
Cupressus sp.	12	0,1 %
Populus sp.	12	0,1 %
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm.	11	0,1 %
Tamarix gallica L.	11	0,1 %
Acer sp.	11	0,1 %
Corylus avellana L.	11	0,1 %
Picea glauca Conica	11	0,1 %
Sambucus nigra L.	10	0,1 %
Fraxinus excelsior Globosum	10	0,1 %
Juniperus virginiana L.	10	0,1 %
Salix alba L.	10	0,1 %
Liriodendron tulipifera L.	10	0,1 %
Taxus cuspidata cv	10	0,1 %
Prunus persica (L.) Batsch	10	0,1 %
Salix x sepulcralis Chrysocoma	10	0,1 %
Platanus occidentalis cv	10	0,1 %
Tilia tomentosa Moench	10	0,1 %
Cotinus coggygria Scop.	10	0,1 %
Corylus colurna L.	9	0,1 %
Ulmus laevis Pall.	9	0,1 %
Acer saccharinum L.	9	0,1 %
Abies concolor Lindl. ex Gord.	8	0,1 %
Ginkgo biloba L.	8	0,1 %
Betula pubescens Ehrh.	8	0,1 %
Magnolia sp.	8	0,1 %
Robinia hispida L.	8	0,1 %
Gleditsia sp.	8	0,1 %
Acer pseudoplatanus Atropurpureum	8	0,1 %
Picea pungens cv	8	0,1 %
Albizia julibrissin Durazz.	7	0,1 %
Juniperus sabina L.	7	0,1 %
Crataegus monogyna cv	7	0,1 %
Magnolia kobus DC.	7	0,1 %
Tilia cordata Erecta	7	0,1 %
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière	7	0,1 %
Juglans nigra L.	7	0,1 %
Morus nigra L.	7	0,1 %

Chamaecyparis obtusa (Siebold et. Zucc.) Endl.	6	0,1 %
Chamaecyparis lawsoniana cv	6	0,1 %
Pyrus calleryana Decne.	6	0,1 %
Pinus mugo Turra	6	0,1 %
Chamaecyparis nootkatensis Pendula	6	0,1 %
Prunus padus L.	6	0,1 %
Cercis siliquastrum L.	6	0,1 %
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	6	0,1 %
Tilia cordata cv	6	0,1 %
Euonymus japonicus Thunb.	6	0,1 %
Pyrus sp.	6	0,1 %
Castanea sativa Mill.	6	0,1 %
Sorbus aucuparia L.	6	0,1 %
Betula sp.	6	0,1 %
Liquidambar styraciflua cv	5	0,0 %
Salix integra Thunb.	5	0,0 %
Cornus mas L.	5	0,0 %
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb	5	0,0 %
Sorbus sp.	5	0,0 %
Salix caprea cv	5	0,0 %
Prunus mahaleb L.	5	0,0 %
Tilia x vulgaris cv	5	0,0 %
Abies sp.	5	0,0 %
Acer platanoides Columnare	5	0,0 %
Hippophae rhamnoides L.	5	0,0 %
Ligustrum vulgare L.	5	0,0 %
Corylus sp.	5	0,0 %
Tilia cordata Greenspire	4	0,0 %
Tilia tomentosa cv	4	0,0 %
Picea sp.	4	0,0 %
Thuja plicata cv	4	0,0 %
Fraxinus angustifolia Vahl	4	0,0 %
Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don	4	0,0 %
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	4	0,0 %
Acer campestre cv	4	0,0 %
Robinia sp.	4	0,0 %
Chamaecyparis pisifera cv	4	0,0 %
Cydonia oblonga Mill.	4	0,0 %
Quercus ilex L.	4	0,0 %
Acer tataricum L.	3	0,0 %

Thuja occidentalis Malonyana	3	0,0 %
Acer platanoides Royal Red	3	0,0 %
Cupressus sempervirens L.	3	0,0 %
Euonymus europaeus L.	3	0,0 %
Pinus mugo cv	3	0,0 %
Acer platanoides Drummondii	3	0,0 %
Magnolia grandiflora L.	3	0,0 %
Salix viminalis L.	3	0,0 %
Carpinus betulus L.	3	0,0 %
Cercis canadensis L.	3	0,0 %
Taxus sp.	3	0,0 %
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco	3	0,0 %
Prunus spinosa L.	3	0,0 %
Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm.	2	0,0 %
Aesculus x carnea Hayne	2	0,0 %
Cedrus deodara cv	2	0,0 %
Juniperus squamata Buch.-Ham.ex Lamb.	2	0,0 %
Populus tremula L.	2	0,0 %
Catalpa ovata G. Don	2	0,0 %
Malus sp.	2	0,0 %
Prunus sp.	2	0,0 %
Elaeagnus pungens L.	2	0,0 %
Ligustrum ovalifolium Hassk.	2	0,0 %
Platanus x acerifolia Alphens Globe	2	0,0 %
Crataegus rhipidophylla Gand.	2	0,0 %
Robinia pseudoacacia Umbraculifera	2	0,0 %
Cornus sanguinea L.	2	0,0 %
Eucalyptus sp.	2	0,0 %
Ulmus minor cv	2	0,0 %
Broussonetia papyrifera (L.) L ´Hér	2	0,0 %
Negundo aceroides cv	2	0,0 %
Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.	2	0,0 %
Platycladus orientalis cv	2	0,0 %
Cupressus arizonica	2	0,0 %
Prunus serullata 'Amanogawa'	2	0,0 %
Laburnum anagyroides Medik.	2	0,0 %
Sorbus aucuparia cv	2	0,0 %
Betula utilis D. Don	2	0,0 %
Acer rubrum L.	2	0,0 %
Pyrus communis cv	2	0,0 %

Cupressus macrocarpa cv	2	0,0 %
Fraxinus excelsior Pendula	1	0,0 %
Yucca filamentosa L.	1	0,0 %
Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C. Cheng	1	0,0 %
Pyrus communis L.	1	0,0 %
Fraxinus angustifolia cv	1	0,0 %
Ulmus glabra Camperdownii	1	0,0 %
Platanus orientalis L.	1	0,0 %
Pyrus calleryana cv	1	0,0 %
Acer platanoides Crimson King	1	0,0 %
Tetradium daniellii (Benn.) T.G.Hartley	1	0,0 %
Abies alba cv	1	0,0 %
Populus balsamifera L.	1	0,0 %
Sorbus torminalis (L.) Crantz	1	0,0 %
Caragana arborescens Lam.	1	0,0 %
Prunus serotina Ehrh.	1	0,0 %
Amygdalus nana L.	1	0,0 %
Thuja occidentalis Aureospicata	1	0,0 %
Abies pinsapo Boiss.	1	0,0 %
Prunus avium cv	1	0,0 %
Quercus robur cv	1	0,0 %
Mespilus germanica L.	1	0,0 %
Fagus sylvatica Purple Fountain	1	0,0 %
Wisteria sinensis (Sims) Sweet	1	0,0 %
Maklura promifera (Raf.) C.K.Schneid.	1	0,0 %
Rosa x hybrida	1	0,0 %
Tilia cordata Debras Delight	1	0,0 %
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchholz	1	0,0 %
Ilex sp.	1	0,0 %
Forsythia x intermedia	1	0,0 %
Acer palmatum Atropurpureum	1	0,0 %
Salix elaeagnos Scop.	1	0,0 %
Amygdalus triloba	1	0,0 %
Quercus robur Fastigiata	1	0,0 %
Tilia platyphyllos cv	1	0,0 %
Ilex aquifolium L.	1	0,0 %
Thuja occidentalis Smaragd	1	0,0 %
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai	1	0,0 %
Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold et Zucc.	1	0,0 %
Zdravotný stav	Počet	%

1. výborný až dobrý	3784	31,8 %
2. zhoršený	3865	32,5 %
3. výrazne zhoršený	2315	19,4 %
4. silno narušený	1600	13,4 %
5. kritický stav/rozpadnutý strom	340	2,9 %
Perspektíva stromu	Počet	%
a) dlhodobá perspektívny	4145	34,8 %
b) krátkodobá perspektívny	6247	52,5 %
c) neperspektívny	1512	12,7 %
Biologický vek stromu	Počet	%
1. mladý strom	3486	29,3 %
2. dospelý strom	8320	69,9 %
3. senescentný strom	98	0,8 %
Vitalita stromu	Počet	%
1. výborná až mierne znížená	5385	45,2 %
2. zreteľne znížená	4082	34,3 %
3. výrazne znížená	1901	16,0 %
4. zvyšková	377	3,2 %
5. suchý (mŕtvy) strom	159	1,3 %
Stabilita stromu	Počet	%
1. výborná až dobrá (nenarušená)	3216	27,0 %
2. zhoršená	4931	41,4 %
3. výrazne zhoršená	2437	20,5 %
4. silno narušená	991	8,3 %
5. kritická	329	2,8 %

Počet stromov určených na výrub: 1 385 ks

Počet stromov určených ako „nebezpečné“: 65 ks

KRY		
Celkový počet hodnotených kríkov (ks)	2799	
Druhové zastúpenie stromov	Počet	%
Hibiscus syriacus L.	324	11,6 %
Syringa vulgaris L.	215	7,7 %
Euonymus japonicus Thunb.	122	4,4 %
Prunus laurocerasus L.	105	3,8 %
Rosa sp.	94	3,4 %
Ligustrum vulgare L.	93	3,3 %
Spiraea vanhouttei	90	3,2 %
Forsythia x intermedia	87	3,1 %
Thuja occidentalis L.	73	2,6 %
Sambucus nigra L.	65	2,3 %
Euonymus fortunei	55	2,0 %
Platycladus orientalis (L.) Franco	53	1,9 %
Berberis thunbergii	52	1,9 %
Buxus sempervirens	51	1,8 %
Philadelphus coronarius	49	1,8 %
Mahonia aquifolium	45	1,6 %
Taxus baccata L.	44	1,6 %
Lonicera pileata	42	1,5 %
Thuja sp.	41	1,5 %
Deutzia scabra	39	1,4 %
Lonicera ligustrina Wall.	38	1,4 %
Rosa x hybrida	38	1,4 %
Pyracantha coccinea	35	1,3 %
Juniperus sp.	34	1,2 %
Ligustrum ovalifolium Hassk.	31	1,1 %
Juniperus horizontalis	31	1,1 %
Forsythia suspensa	28	1,0 %
Cornus sanguinea L.	27	1,0 %
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm.	26	0,9 %
Juniperus sabina L.	25	0,9 %
Spiraea sp.	22	0,8 %
Prunus sp.	21	0,8 %
Chamaecyparis sp.	20	0,7 %
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.	20	0,7 %
Buddleja davidii	19	0,7 %
Rosa canina	18	0,6 %

Taxus cuspidata cv	17	0,6 %
Taxus cuspidata Siebold et Zucc.	16	0,6 %
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai	15	0,5 %
Berberis Julianae	14	0,5 %
Cotoneaster sp.	14	0,5 %
Viburnum rhytidophyllum	13	0,5 %
Prunus cerasifera Ehrh.	13	0,5 %
Robinia pseudoacacia L.	13	0,5 %
Juniperus chinensis L.	13	0,5 %
Levandula sp.	13	0,5 %
Thuja occidentalis cv	12	0,4 %
Photinia x fraseri cv.	12	0,4 %
Pinus sp.	12	0,4 %
Tamarix gallica L.	11	0,4 %
Prunus spinosa L.	11	0,4 %
Corylus avellana L.	11	0,4 %
Cotoneaster horizontalis	11	0,4 %
Pinus mugo Turra	11	0,4 %
Cotoneaster dammeri	10	0,4 %
Cotinus coggygria Scop.	8	0,3 %
Hedera helix	8	0,3 %
Yucca filamentosa L.	8	0,3 %
Cornus mas L.	8	0,3 %
Tilia cordata Mill.	8	0,3 %
Ilex aquifolium L.	7	0,3 %
Psycocarpus opulifolium Diabolo	7	0,3 %
Thuja plicata cv	7	0,3 %
Aucuba japonica	7	0,3 %
Weigela florida	7	0,3 %
Salix sp.	7	0,3 %
Picea glauca (Moench) Voss	7	0,3 %
Ulmus pumila L.	7	0,3 %
Spiraea japonica	7	0,3 %
Cupressus sp.	6	0,2 %
Hydrangea sp.	6	0,2 %
Ionicera nitida	6	0,2 %
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	6	0,2 %
Robinia hispida L.	6	0,2 %
Platycladus orientalis cv	6	0,2 %
Symphoricarpos albus	6	0,2 %

Juniperus virginiana L.	6	0,2 %
Chamaecyparis obtusa (Siebold et. Zucc.) Endl.	5	0,2 %
Rhus typhina L.	5	0,2 %
Magnolia sp.	5	0,2 %
Ribes sp.	5	0,2 %
Picea glauca Conica	5	0,2 %
Psycocarpus opulifolius	5	0,2 %
Caryopteris x clandonensis	5	0,2 %
Juniperus virginiana cv	5	0,2 %
Symphoricarpos chenaultii	5	0,2 %
Salvia rosmarinus	4	0,1 %
Caragana arborescens Lam.	4	0,1 %
Eucalyptus sp.	4	0,1 %
Acer campestre L.	4	0,1 %
Lonicera tatarica	4	0,1 %
Nerium oleander	4	0,1 %
Ficus carica L.	4	0,1 %
Juniperus communis cv	4	0,1 %
Lycium barbarum	4	0,1 %
Hippophae rhamnoides L.	3	0,1 %
Picea pungens Engelm.	3	0,1 %
Euonymus europaeus L.	3	0,1 %
Lonicera xylosteum	3	0,1 %
Morus alba L.	3	0,1 %
Magnolia kobus DC.	3	0,1 %
Photinia glabra (Thunb.) Maxim.	3	0,1 %
Cotoneaster divaricatus	3	0,1 %
Hypericum calycinum	3	0,1 %
Non specificum	3	0,1 %
Chamaecyparis lawsoniana cv	3	0,1 %
Cotoneaster Salicifolium	3	0,1 %
Robinia sp.	3	0,1 %
Prunus padus L.	3	0,1 %
Acer palmatum Atropurpureum	2	0,1 %
Viburnum latana	2	0,1 %
Laburnum anagyroides Medik.	2	0,1 %
Erica vagans	2	0,1 %
Kerria japonica	2	0,1 %
Taxus sp.	2	0,1 %
Populus nigra L.	2	0,1 %

Negundo aceroides Moench	2	0,1 %
Salix caprea L.	2	0,1 %
Lonicera fragrantissima	2	0,1 %
Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don	2	0,1 %
Ilex crenata	2	0,1 %
Celtis occidentalis L.	2	0,1 %
Lagerstroemia sp.	2	0,1 %
Ligustrum japonicum	2	0,1 %
Thuja plicata Don ex D. Don	2	0,1 %
Cytisus scoparius	2	0,1 %
Rubus sp.	2	0,1 %
Abies alba Mill.	2	0,1 %
Rubus idaeus	2	0,1 %
Picea abies cv	2	0,1 %
Ilex sp.	2	0,1 %
Populus x canadensis Moench	2	0,1 %
Populus x canescens (Aiton) Sm.	2	0,1 %
Sophora japonica L.	2	0,1 %
Vinca minor	2	0,1 %
Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.	2	0,1 %
Elaeagnus macrophylla	2	0,1 %
Corylus sp.	1	0,0 %
Olea europaea	1	0,0 %
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	1	0,0 %
Malus baccata (L.) Borkh.	1	0,0 %
Ulmus minor Mill.	1	0,0 %
Carpinus betulus L.	1	0,0 %
Tilia platyphyllos Scop.	1	0,0 %
Nandina domestica	1	0,0 %
Spiraea thunbergii	1	0,0 %
Elaeagnus pungens L.	1	0,0 %
Sorbaria sorbifolia	1	0,0 %
neznámy druh	1	0,0 %
Rosa rugosa	1	0,0 %
Robinia pseudoacacia cv	1	0,0 %
Rhodotypos scandens	1	0,0 %
Carpinus betulus 'Columnaris'	1	0,0 %
Ulmus laevis Pall.	1	0,0 %
Fraxinus excelsior L.	1	0,0 %
Veronica brachysiphon	1	0,0 %

Acer pseudoplatanus cv	1	0,0 %
Fagus sylvatica cv	1	0,0 %
Amorpha fruticosa	1	0,0 %
Juniperus communis L.	1	0,0 %
Thuja occidentalis Aureospicata	1	0,0 %
Syringa pubescens	1	0,0 %
Amygdalus nana L.	1	0,0 %
Cydonia oblonga Mill.	1	0,0 %
Viburnum opulus	1	0,0 %
Cercis canadensis L.	1	0,0 %
Rhododendron sp.	1	0,0 %
Sorbus sp.	1	0,0 %
Lonicera maackii	1	0,0 %
Prunus subhirtella Autumnalis Rosea	1	0,0 %
Cornus sericea	1	0,0 %
Campsis radicans	1	0,0 %
Cotoneaster integerrimus	1	0,0 %
Camellia japonica	1	0,0 %
Liriodendron tulipifera L.	1	0,0 %
Salix x sepulcralis Chrysocoma	1	0,0 %
Berberis gagnepainii	1	0,0 %
Salix matsudana Tortuosa	1	0,0 %
Fraxinus ornus L.	1	0,0 %
Prunus lusitanica cv.	1	0,0 %
Tsuga canadensis (L.) Carrière	1	0,0 %
Eleagnus umbellata Thunb.	1	0,0 %
Prunus sp.	1	0,0 %
Santolina decumbens	1	0,0 %
Salix integra Thunb.	1	0,0 %
Chamaecyparis pisifera Boulevard	1	0,0 %
Prunus avium (L.) L.	1	0,0 %
Pinus mugo cv	1	0,0 %
Rubus caesius	1	0,0 %
Viburnum tinum	1	0,0 %
Prunus cerasus L.	1	0,0 %
Magnolia x soulangeana	1	0,0 %